

## Moment de prise des anti-infectieux (hormis traitements du VIH et des hépatites)

DCI	NOM	REPAS
Acide fusidique	Fucidin <sup>®</sup>	
Aciclovir	Zovirax <sup>®</sup>	
Albendazole	Zentel <sup>®</sup>	!!
Amantadine	Symmetrel <sup>®</sup>	
Amoxicilline	Amoxi <sup>®</sup>	
Amoxicilline + ac clavulanique	Augmentin <sup>®</sup>	!
Amphotéricine B	Ampho- monoral <sup>®</sup>	
Artemether + luméfantrine	Riamet <sup>®</sup>	!!
Atovaquone	Wellvone <sup>®</sup>	!!
Atovaquone + proguanil	Malarone <sup>®</sup>	!!
Azithromycine	Zithromax <sup>®</sup>	
Brivudine	Brivex <sup>®</sup>	
Cefaclor	Ceclor <sup>®</sup>	Susp. Caps ret !
Cefpodoxime	Podomexef <sup>®</sup>	!
Cefuroxime	Zinat <sup>®</sup>	Caps Susp. !
Chloroquine	Nivaquine <sup>®</sup>	!
Ciprofloxacine	Ciproxine <sup>®</sup>	
Clarithromycine	Klacid <sup>®</sup>	
Clindamycine	Dalacin C <sup>®</sup>	
Co-trimoxazole	Bactrim <sup>®</sup>	
Diéthylcarbama zine	Notézine <sup>®*</sup>	!
Doxycycline	Oracea <sup>®</sup>	Caps ret
Doxycycline	Vibramycine <sup>®</sup>	

DCI	NOM	REPAS
Ethambutol	Myambutol <sup>®</sup>	
Famciclovir	Famvir <sup>®</sup>	
Fluconazole	Diflucan <sup>®</sup>	
Fosfomycine	Monuril <sup>®</sup>	
Hydroxy- chloroquine	Plaquenil <sup>®</sup>	!
Iodoquinol	PM	
Isoniazide	Isoniazide <sup>®</sup>	
Itraconazole	Sporanox <sup>®</sup>	Caps ! Sol.
Ivermectine	Subvectin <sup>®</sup>	Gale/Poux !! Autre indic.
Lévofloxacine	Tavanic <sup>®</sup>	
Linézolide	Zyvoxid <sup>®</sup>	
Lymécycline	Tetralysal <sup>®</sup>	
Mebendazole	Vermox <sup>®</sup>	
Méfloquine	Mephaquin <sup>®</sup>	!
Metronidazole	Flagyl <sup>®</sup>	
Minocycline	Minocin <sup>®</sup>	
Moxifloxacine	Avalox <sup>®</sup>	
Niclosamide	Tredemine <sup>®*</sup>	Croquer
Nitrofurantoïne	Uvamin ret. <sup>®</sup> Furadantin ret. <sup>®</sup>	!
Norfloxacine	Norsol <sup>®</sup>	
Nystatine	Mycostatine <sup>®</sup>	
Ornidazole	Tiberal <sup>®</sup>	
Oseltamivir	Tamiflu <sup>®</sup>	
Paromomycine	Humatin <sup>®</sup>	
Penicilline V	Ospen <sup>®</sup>	
Posaconazole	Noxafil <sup>®</sup>	Cpr Sol. !

**Légende :**

- Peut être pris avec un repas pour diminuer les troubles gastriques
- ! Doit être pris avec un repas pour augmenter l'absorption
- !! Doit être pris avec un repas riche en graisses pour augmenter l'absorption
- À jeun : minimum 1h avant ou 2h après un repas pour augmenter l'absorption
- \* Médicament étranger

## Moment de prise des anti-infectieux (hormis traitements du VIH et des hépatites)

DCI	NOM	REPAS
Praziquantel	Biltricide <sup>®*</sup>	!
Primaquine phosphate	PM	
Proguanil	Paludrine <sup>®</sup>	
Proguanil + chloroquine	Savarine <sup>®*</sup>	!
Pyrantel	Cobantril <sup>®</sup>	
Pyrazinamide	Pyrazinamide <sup>®</sup> Labatec	
Pyriméthamine	Daraprim <sup>®</sup>	
Rifabutine	Mycobutin <sup>®</sup>	
Rifampicine	Rimactan <sup>®</sup>	
Rifampicine + Isoniazide	Rifinah <sup>®</sup>	
Rifampicine + isoniazide + pyrazinamide	Rifater <sup>®</sup>	
Rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol	Rimstar <sup>®</sup>	
Spiramycine	Rovamycine <sup>®*</sup>	
Sulfaméthoxazole + triméthoprime	Bactrim <sup>®</sup>	
Terbinafine	Lamisil <sup>®</sup>	
Tinidazole	Fasigyne <sup>®*</sup>	
Valaciclovir	Valtrex <sup>®</sup>	
Valganciclovir	Valcyte <sup>®</sup>	!
Vancomycine	Vancocin <sup>®</sup>	
Voriconazole	Vfend <sup>®</sup>	





Les noms de spécialités associés à la liste des DCI n'est pas exhaustive : le nom de l'original est cité à titre indicatif ; pour un générique de forme galénique identique un même moment de prise est envisageable.

Ce tableau est issu du croisement des données des sources consultées ci-dessous. La pharmacie d'Unisanté est en mesure de vous fournir le détail sur demande.

**Sources consultées :** Compendium, Sanford 2020, Antibiotic Essentials, Micromedex, UptoDate, ClinicalPharmacology, hep-Swissmedicinof.ch

Unisanté décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations ci-dessus hors de ses structures et/ou hors du contexte auquel elles sont destinées. La documentation peut être diffusée librement pour autant que cela ne relève pas d'un but commercial et que la source et la date d'édition soient citées. En cas de non-respect de ces exigences, Unisanté se réserve le droit d'ouvrir action en justice devant les tribunaux ordinaires.

### Légende :

-  Peut être pris avec un repas pour diminuer les troubles gastriques
  -  Doit être pris avec un repas pour augmenter l'absorption
  -  Doit être pris avec un repas riche en graisses pour augmenter l'absorption
  -  À jeun : minimum 1h avant ou 2h après un repas pour augmenter l'absorption
- \* Médicament étranger