

Moment de prise des traitements des hépatites

NOM	DCI	REPAS
Baraclude®	Entécavir	!!
	Ribavirine	!!
Epclusa®	Sofosbuvir + Velpatasvir	
Harvoni®	Sofosbuvir + Lédipasvir	
Maviret®	Glécaprévir + Pibrentasvir	!
Sebivo®	Telbivudine	
Sovaldi®	Sofosbuvir	
Vemlidy®	Ténofovir alafénamide	!!
Viread®	Ténofovir disoproxil	!
Vosevi®	Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprévir	!
Zeffix®	Lamivudine	
Zepatier®	Grazoprévir + Elbasvir	

Sources consultées : Compendium, Sanford 2020, Micromedex, UptoDate, ClinicalPharmacology, Hep drug interactions, swissmedicinfo.ch

Les noms de spécialités associés à la liste des DCI n'est pas exhaustive : le nom de l'original est cité à titre indicatif ; pour un générique de forme galénique identique un même moment de prise est envisageable.

Légende:

- Peut être pris avec un repas pour diminuer les troubles gastriques
- ! Doit être pris avec un repas pour augmenter l'absorption
- !! Doit être pris avec un repas riche en graisses pour augmenter l'absorption
- À jeun : minimum 2h avant ou 2h après un repas pour augmenter l'absorption

Unisanté décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations ci-dessus hors de ses structures et/ou hors du contexte auquel elles sont destinées. La documentation peut être diffusée librement pour autant que cela ne relève pas d'un but commercial et que la source et la date d'édition soient citées. En cas de non-respect de ces exigences, Unisanté se réserve le droit d'ouvrir action en justice devant les tribunaux ordinaires.