


Moment de prise des anticancéreux oraux

NOM COMMERCIAL	DCI	REPAS
<i>Afinitor</i>	évérolimus	
<i>Alecensa</i>	alectinib	!
<i>Alkeran</i>	melphalan	
<i>Alunbrig</i>	brigatinib	
<i>Androcur</i>	acétate de cyprotérone	!
<i>Arimidex</i>	anastrozole	
<i>Aromasin</i>	exémestane	!(après le repas)
<i>Bosulif</i>	bosutinib	!
<i>Braftovi</i>	encorafénib	
<i>Brukinsa</i>	zanubrutinib	
<i>Cabometyx</i>	cabozantinib	
<i>Calquence</i>	acalabrutinib	
<i>Caprelsa</i>	vandétanib	
<i>Casodex</i>	bicalutamide	
<i>Cotellic</i>	cobimétinib	
<i>Erleada</i>	apalutamide	
<i>Erivedge</i>	vismodégib	
<i>Exkivity</i>	mobocertinib	
<i>Farlutal</i>	acétate de médroxyprogesté- rone	
<i>Farydak</i>	panobinostat	
<i>Femara</i>	létrazole	
<i>Gavreto</i>	pralsétinib	
<i>Giotrif</i>	afatinib	1h avant ou 3h après
<i>Glivec / Glivec GIST</i>	imatinib	!
<i>Hycamtin</i>	topotécan	
<i>Ibrance</i>	palbociclib	!

NOM COMMERCIAL	DCI	REPAS
<i>Iclusig</i>	ponatinib	
<i>Imbruvica</i>	ibrutinib	
<i>Imnovid</i>	pomalidomide	
<i>Inlyta</i>	axitinib	
<i>Inrebic</i>	fédératinib	
<i>Iressa</i>	géfítinib	
<i>Jakavi</i>	ruxolitinib	
<i>Kisplyx</i>	lenvatinib	
<i>Kisqali</i>	ribociclib	
<i>Koselugo</i>	sélumétinib	
<i>Lanvis</i>	thioguanine	
<i>Lenvima</i>	lenvatinib	
<i>Leukeran</i>	chlorambucil	
<i>Litalir</i>	hydroxycarbamide	
<i>Lonsurf</i>	trifluridine+tipiracil	!(max. 1h après)
<i>Lorviqua</i>	lorlatinib	
<i>Lumykras</i>	sotorasib	
<i>Lynparza</i>	olaparib (cpr)	
<i>Mekinist</i>	tramétinib	
<i>Mektovi</i>	binimétinib	
<i>Methotrexate</i>	méthotrexate (≤ 15 mg)	
	méthotrexate (> 15 mg)	
<i>Nexavar.</i>	sorafénib	
<i>Ninlaro</i>	ixazomib	
<i>Nolvadex</i>	tamoxifène	

Légende :



Peut être pris avec un repas

Doit être pris avec un repas

À jeun : minimum 1h avant ou 2h après un repas (ou selon commentaire)

NOM COMMERCIAL	DCI	REPAS
Nubeqa	darolutamide	!
Ofev	nintédanib	!
Onureg	azacitidine	
Pemazyre	pémigatinib	
Piqray	alpélisib	! (directement après le repas)
Puri-Nethol	mercaptopurine	
Qinlock	ripréтинib	
Retsevmo	selpercatinib	
Revlimid.	lénalidomide	
Rozlytrek	entrectinib	
Rubraca	rucaparib	
Rydapt	midostaurine	!
Scemblix	asciminib	
Sprycel	dasatinib	
Stivarga	régorafénib	! (repas léger)
Sutent	sunitinib	
Tabrecta	capmatinib	
Tafinlar	dabrafénib	
Tagrisso	osimertinib	
Talzenna	talazoparib	
Tarceva.	erlotinib	
Tasigna	nilotinib	
Temodal.	témozolomide	
Tepmetko	tépotinib	!
Tukysa	tucatinib	
Tyverb	lapatinib	
Venclyxto	vénétoclax	!

NOM COMMERCIAL	DCI	REPAS
Vepesid	étoposide	
Verzenios	abémaciclib	
Vittrakvi	larotrectinib	
Votrient	pazopanib	
Votubia	évérolimus	
Xagrid.	anagrélide	
Xalkori	crizotinib	
Xeloda	capécitabine	! (max. 30 min. après)
Xospata	giltéritinib	
Xtandi	enzalutamide	
Zavedos	idarubicine	! (repas léger)
Zejula	niraparib	
Zelboraf	vemurafénib	
Zydelig	idelalisib	
Zykadia	céritinib	!
Zytiga	abiratérone	

Les noms de spécialités associés à la liste des DCI n'est pas exhaustive : le nom de l'original est cité à titre indicatif ; pour un générique de forme galénique identique un même moment de prise est envisageable.

Ce tableau est issu du croisement des données des sources consultées ci-dessous. La pharmacie d'Unisanté est en mesure de vous fournir le détail sur demande.

Sources : BC Cancer, ClinicalPharmacology, Institut National du Cancer, Netcancer.net, Omedit Bretagne, Swissmedicinfo, UpToDate.

Unisanté décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations ci-dessus hors de ses structures et/ou hors du contexte auquel elles sont destinées. La documentation peut être diffusée librement pour autant que cela ne relève pas d'un but commercial et que la source et la date d'édition soient citées. En cas de non-respect de ces exigences, Unisanté se réserve le droit d'ouvrir action en justice devant les tribunaux ordinaires.

Légende :

	Peut être pris avec un repas
	Doit être pris avec un repas
	À jeun : minimum 1h avant ou 2h après un repas (ou selon commentaire)