

¿CUÁNDO HACER EL CRIBADO?

Por lo general, no antes de los 3 meses (12 semanas) desde el contacto de riesgo más reciente.

Excepciones: En caso de contacto de riesgo con una antigüedad inferior a 48 horas, se ruega acudir sin demora a un servicio de urgencias para valorar la posible toma de tratamiento profiláctico frente al VIH.

Solo para el VIH, se le puede ofrecer una prueba de sangre estándar (= no una prueba rápida) no antes de las 6 semanas desde el contacto de alto riesgo más reciente.

EL DÍA DE SU CONSULTA:

Por favor, lleve su cartilla de vacunación a la consulta (si dispone de ella).

Para aumentar el rendimiento de las pruebas:

- No orine en las 2 horas anteriores a su consulta

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

Dependiendo de los análisis realizados, los resultados pueden estar disponibles de inmediato o se le comunicarán posteriormente.

COSTE

- **Consulta**

CHF 80.- / Gratis para menores de 25 años

- **Prueba rápida de VIH**

CHF 20.- / CHF 12.- para menores de 25 años

- **Pruebas estándar de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C**

CHF 20.- a CHF 55.- / CHF 10.- a CHF 30.- para menores de 25 años

- **Pruebas estándar de clamidia y gonococo**

CHF 70.- / CHF 30.- para menores de 25 años

Rue du Bugnon 44

CH - 1011 Lausanne

TropiVac / VISTA Repcion / 5to piso

www.unisante.ch