

## INS1672 Insulines et autres stylos injectables dans le diabète : moment d'administration et utilisation

Destinataire : Pharmacie d'Unisanté

Type d'action	Type d'insuline et autres stylos injectables	Moment d'administration	Adm. par jour	Solution / Suspension
Ultrarapide	Apidra® (insuline glulisine)	Peu avant ou immédiatement après les repas	1 à 3	Solution
	Humalog® (insuline lispro)	Peu avant ou immédiatement après les repas	1 à 3	Solution
	Lyumjev® (insuline lispro)	Peu avant ou immédiatement après les repas	1 à 3	Solution
	Insuline NovoRapid® (insuline asparte)	Peu avant ou immédiatement après les repas	1 à 3	Solution
	Fiasp® (insuline asparte)	Peu avant ou immédiatement après les repas	1 à 3	Solution
Rapide	Insuline Actrapid HM® (insuline humaine)	Max. 30 min. avant le repas	1 à 3	Solution
Intermédiaire	Huminsulin Basal® (insuline humaine NPH / protamine + zinc)	30-45 min. avant le repas	1 à 2	Suspension
	Insuline Insulatard HM® (insuline humaine NPH / protamine + zinc)	Au moment du repas ou indépendant du repas	1 à 2	Suspension
Lente	Insuline Levemir® (insuline détémir)	Indépendant du repas	1 à 2	Solution
	Lantus® (insuline glargin)	Indépendant du repas	1	Solution
	Toujeo® (insuline glargin)	Indépendant du repas	1	Solution
	Abasaglar® (insuline glargin)	Indépendant du repas	1	Solution
Ultra-lente	Tresiba® 100 Tresiba® 200 (insuline dégludec)	Indépendant du repas	1	Solution
Très rapide/ intermédiaire	Humalog Mix 25® (25 % insuline lispro + 75 % insuline lispro-isophane )	Peu avant ou immédiatement après les repas	2 à 3	Suspension
	Humalog Mix 50® (50 % insuline lispro + 50 % insuline lispro-isophane )	Peu avant ou immédiatement après les repas	2 à 3	Suspension
Très rapide/ ultralente	Ryzodeg® (insuline asparte / insuline dégludec)	Au moment du repas	1 à 2	Solution

Type d'action	Type d'insuline et autres stylos injectables	Moment d'administration	Adm. par jour	Solution / Suspension
Analogue	Bydureon® BCise (éxenatide)	Indépendant du repas	1 fois par semaine	Suspension
	Victoza® (liraglutide)	Indépendant du repas	1	Solution
	Trulicity® (dulaglutide)	Indépendant du repas	1 fois par semaine	Solution
	Ozempic® DualDose Ozempic® FixDose (sémaglutide)	Indépendant du repas	1 fois par semaine	Solution
Analogue/ insuline lente	Suliqua® 100/33 Suliqua® 100/50 (insuline glargin et lixisénatide)	0-60 min. avant un repas	1	Solution
Analogue/ insuline ultralente	Xultophy® (liraglutide et insuline dégludec)	Indépendant du repas	1	Solution
Agoniste RGIP & GLP-1	Mounjaro® (tirzépatide)	Indépendant du repas	1 fois par semaine	Solution

Suspension : rouler entre les paumes des mains 10 fois, puis retourner 10 fois (bascule de 180°), juste avant usage

Solution : ne pas agiter avant emploi

Adm. = administration

RGIP & GLP-1 : Récepteur au GIP et au GLP-1

HM : Humaines Monocomposées

Références :

[www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch),

[www.diamip.org](http://www.diamip.org)

<http://www.pharmavista.ch>

<https://www.diabetevaud.ch/>

[Insulines et analogues: tableau comparatif \(phel.ch\)](#)

Unisanté décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations ci-dessus hors de ses structures et/ou hors du contexte auquel elles sont destinées. La documentation peut être diffusée librement pour autant que cela ne relève pas d'un but commercial et que la source et la date d'édition soient citées. En cas de non-respect de ces exigences, Unisanté se réserve le droit d'ouvrir action en justice devant les tribunaux ordinaires.