

Objet :

Ce document a pour but de recenser les informations nécessaires à la pratique du frottis naso-pharyngé à la recherche de CoVID-19 au cabinet médical. Dans le cas où le cabinet ne réalise pas de frottis, la liste des centres auxquels adresser le patient est référencée dans le [document Centres de dépistage](#).

Frottis naso-pharyngé

Pour le frottis naso-pharyngé : le port de masque de soins type II ([Document Information masques](#)) et le port de gants sont recommandés. S'il y a un risque de projections de liquides biologiques des lunettes de protection, et surblouses peuvent être utilisés.

Il s'agit de réaliser un frottis naso-pharyngé profond avec écouvillon e-SWAB (semblable à recherche grippe). Pendant le frottis, abaissez juste le masque du patient pour dégager son nez de façon à ce que sa bouche reste couverte.

Il est impératif que le frottis atteigne le naso-pharynx (env 7cm).

La procédure est expliquée sur [cette vidéo, mise à disposition par le New England Journal of Medicine](#).

Il ne faut pas faire un frottis nasal et un frottis pharyngé séparés, les performances du test seront mauvaises (faux négatifs)

Attention :

- **Le tube d'échantillon doit être désinfecté** avant son introduction dans la pochette plastique.
- Ne pas oublier d'inscrire le nom, prénom et date de naissance du patient sur la pochette plastique.

Matériel et Traitement des prélèvements :

Le matériel de prélèvement est obtenu auprès du laboratoire habituel du cabinet ou auprès du laboratoire qui traite le prélèvement.

Les prélèvements sont adressés au CHUV selon les directives [HPCI](#) ou dans le laboratoire habituel avec lequel travaille le cabinet. Les prélèvements doivent être **adressés avant 16h pour un traitement le jour même**. Le résultat est rendu dans les 24 heures. **Le médecin du cabinet qui a demandé l'analyse informe le patient du résultat du test au plus tôt.**

Documents et textes de références

[Liste lieux de dépistage CoVID-19 Vaud 16-03-20.pdf](#)

<https://www.hpci.ch/prevention/recommandations/contenu/n-cov-prise-en-charge-dun-patient-suspect-dinfection-a>